

تم تحميل ورفع المادة على منصة



للعودة الى الموقع اكتب في بحث جوجل



المعلم التعليمي



ALMUALM.COM

الفصل الأول

المعادلات الخطية

حل المعادلات

حل المعادلات ذات
الخطوة الواحدة

حل المعادلات ذات
المتعددة الخطوات

حل المعادلات التي تحتوي
متغيراً في طرفيها

حل المعادلات التي تتضمن
القيمة المطلقة

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أهل معادلات ذات متغير واحد
- ✓ أهل معادلات ذات متغيرين

١-١ المعادلات



تذكر:

العبارات الجبرية وتبسيطها



المتطابقة



معادلة طرفها متكافئان
دائماً مثل $2+5=2+5$
وحلها مجموعة الأعداد الحقيقية

المعادلة



عبارتين جبرية يفصل بينهما
إشارة مساواة ويمكن فيها
إيجاد قيمة المتغير مثل
 $0=2+5$

العلاقة الجبرية



العلاقة التي لا تحتوي على
إشارة
مساواة مثل $5+7$

استعمال مجموعة التعويض



في مجموعة الأعداد التي نعوض بها عن قيمة
المتغير لتحديد مجموعة الحل
أوجد مجموعة حل المعادلة $2+5=4$ إذا كانت
مجموعة التعويض هي $\{0, 1, 2\}$

صح أم خطأ	$4=2+5$	5
خطأ	$2=2+0$	0
خطأ	$3=2+1$	1
صح	$4=2+2$	2

إذا مجموعة الحل $\{2\}$

حلول المعادلات

أولاً: المعادلات التي لها حل وحيد



$$m(3-5) = m + (3+2)$$

$$m^2 = m + 5$$

$$m - m^2 = 0$$

$$m = 0$$

إذا المعادلة حل وحيد هو 0

ثانياً: المعادلات التي لا يوجد لها حل



$$2m + 4 = (3-m)^2$$

$$2m + 4 = 9 - 6m + m^2$$

$$m^2 - 8m + 5 = 0$$

$$10 = 0$$

المعادلة غير صحيحة إذا لا يوجد لها حل

ثالثاً: المتطابقات



$$3b + 3 = 3(1+b)$$

المعادلة

$$3b + 3 = 3 + 3b$$

الطرف الأيمن = الطرف الأيسر

إذا المعادلة دائماً صحيحة ويكون حلها

مجموعة الأعداد الحقيقية

معادلات تحتوي على متغيرين



يقود فهد سيارته بمعدل 100 كلم في الساعة ، اكتب
معادلة وحلها لإيجاد الزمن الذي سيستغرقه للسفر
مسافة 500 كلم ؟

المسافة (ف) = 500 كلم ، السرعة (ع) = 100 كلم / ساعة

الزمن (و) = ؟

$$\frac{500}{100} = \frac{100}{100}$$

إذا الزمن 5 = 5 ساعات

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل معادلات باستعمال الجمع أو الطرح
- ✓ أحل معادلات باستعمال الضرب أو القسمة



تذكر:



كيفية التعبير عن الجمل
الكلامية بمعادلات

١-٢ حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة

حل المعادلة التالية : ج - ٢ = ٣

إضافة ٢ للطرفين

$$٢ + ٣ = \cancel{٢} + \cancel{٢} - ج$$

$$٥ = ج$$

للتحقق من صحة الحل / نعوض عن قيمة ج في

$$✓ \text{ المعادلة } ٣ = ٥ - ٢$$

حل المعادلات بالجمع

حل المعادلة التالية : ج + ٥ = ٧

إضافة -٥ للطرفين

$$٥ - ٧ = \cancel{٥} - \cancel{٥} + ج$$

$$٢ = ج$$

للتحقق من صحة الحل / نعوض عن قيمة ج في المعادلة

$$✓ \text{ المعادلة } ٧ = ٥ + ٢$$

حل المعادلات بالطرح

حل المعادلة التالية : $\frac{١}{٣} س = ٢$ بضرب الطرفين في ٣

$$٦ = س$$

$$\cancel{٣} \left(\frac{١}{٣} س \right) = \cancel{٣} (٢)$$

للتحقق من صحة الحل / نعوض عن قيمة س في المعادلة

$$✓ \text{ المعادلة } ٢ = (٦) \frac{١}{٣}$$

حل المعادلات بالضرب

حل المعادلة التالية : $٣ س = ٩$

بقسمة الطرفين على ٣

$$\frac{٩}{٣} = \cancel{٣} س$$

$$٣ = س$$

للتحقق من صحة الحل / نعوض عن قيمة س في المعادلة

$$✓ \text{ المعادلة } ٩ = (٣) ٣$$

حل المعادلات بالقسمة

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل معادلات متعددة الخطوات
- ✓ أحل المعادلات التي تتضمن أعداد صحيحة متتالية

١-٣ حل المعادلات المتعددة الخطوات

تذكر:



حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة

حل معادلة متعددة الخطوات

$$x = \frac{0 - 5}{2}$$

$$2 \times x = \frac{0 - 5}{2} \times 2$$

$$2x = 0 - 5$$

$$1x = -5 \leftarrow 0 + 8 = \cancel{0} + \cancel{0} - 5$$

$$3 = 7 + 2x$$

$$7 - 3 = \cancel{7} - \cancel{7} + 2x$$

$$4 = 2x$$

$$\frac{4}{2} = \frac{2x}{2}$$

$$2 = x \leftarrow$$

حل مسائل تتضمن أعداد صحيحة متتالية

أعداد زوجية وفردية متتالية

أعداد صحيحة متتالية

أوجد ثلاثة أعداد صحيحة زوجية متتالية مجموعها ٣٦؟

$$36 = (4 + 6) + (2 + 6) + 6$$

$$36 = 6 + 6 + 6$$

$$7 - 36 = 7 - 6 + 6 + 6$$

$$\frac{36}{3} = 12 \quad \text{بقسمة الطرفين على 3} \quad 36 = 6 + 6 + 6$$

$$14, 12, 10 \quad 10 = 6$$

أوجد ثلاثة أعداد صحيحة فردية متتالية مجموعها ٢١؟

$$21 = (4 + 6) + (2 + 6) + 6$$

$$21 = 6 + 6 + 6$$

$$7 - 21 = 7 - 6 + 6 + 6$$

$$\frac{21}{3} = 7 \quad \text{بقسمة الطرفين على 3} \quad 21 = 6 + 6 + 6$$

$$9, 7, 5 \quad 5 = 6$$

أوجد ثلاثة أعداد صحيحة متتالية مجموعها ٢١؟

$$21 = (2 + 6) + (1 + 6) + 6$$

$$21 = 3 + 6 + 6$$

$$3 - 21 = 3 - 6 + 6 + 6$$

$$\frac{21}{3} = 7 \quad \text{بقسمة الطرفين على 3} \quad 21 = 3 + 6 + 6$$

$$18, 17, 16 \quad 16 = 6$$

أوجد ثلاثة أعداد صحيحة متتالية مجموعها ٣٠؟

$$30 = (2 + 6) + (1 + 6) + 6$$

$$30 = 3 + 6 + 6$$

$$3 - 30 = 3 - 6 + 6 + 6$$

$$\frac{30}{3} = 10 \quad \text{بقسمة الطرفين على 3} \quad 30 = 3 + 6 + 6$$

$$11, 10, 9 \quad 9 = 6$$

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل المعادلات التي تحتوي الممتغير نفسه في طرفيها
- ✓ أحل المعادلات التي تحتوي أقواس

١-٤ حل المعادلات التي تتضمن متغيراً في طرفيها

تذكر:



حل المعادلات المتعددة الخطوات

حل معادلة تحتوي متغير في طرفيها

حل المعادلة التالية : $3 = 2 + 4$ ف

$$3 - 3 = 2 + 4 - 3$$

بطرح ٣ من الطرفين

$$0 = 2 + 1$$

للتحقق من صحة الحل / نعوض عن قيمة ف في المعادلة

$$3 = 2 + (1) 4$$

$$8 = 2 + 6$$

$$\checkmark 8 = 8$$

حل معادلة تحتوي أقواس

حل المعادلة التالية : $3(2 + 1) = 2 - (1 - 1)$

للتحقق من صحة الحل /

نعوض عن قيمة ١ في المعادلة

$$3(2 + 1) = 2 - (1 - 1)$$

$$3(3) = 2 - (0)$$

$$9 = 2 - 0$$

$$9 = 2$$

$$\checkmark 9 = 9$$

$$3(2 + 1) = 2 - (1 - 1)$$

$$3(2 + 1) = 2 - (1 - 1)$$

$$9 = 2 - 0$$

$$9 = 2 - 0$$

$$9 = 2$$

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحسب قيمة عبارات تتضمن قيمة مطلقة
- ✓ أحل معادلات تتضمن قيمة مطلقة

١-٥ حل المعادلات التي تتضمن القيمة المطلقة

تذكر:




حل المعادلات التي تحتوي متغير في طرفيها



القيمة المطلقة مثل المصفاة تخرج منها جميع الأعداد دائماً بإشارة موجبة سواء كانت أعداد موجبة أو سالبة مثلاً:


$$3+ = |3|, \quad 5- = |5-|$$

$$2 = |3-|$$




نقطة المنتصف = 3+
المسافة المقطوعة = 2

$$2 = |3+|$$



نقطة المنتصف = 3-
المسافة المقطوعة = 2

$$2 = |5-|$$




نقطة المنتصف = 0
المسافة المقطوعة = 2

كتابة معادلة القيمة المطلقة

المطلقة

اكتب معادلة تتضمن

قيمة مطلقة للتمثيل التالي



أولاً: نوجد نقطة المنتصف

$$\frac{(-6) + 6}{2} = \text{صفر}$$

ثانياً: نوجد المسافة بين نقطة المنتصف وإحدى النقطتين

المسافة بين الصفر و 6 = 6

المسافة بين الصفر و -6 = 6

ثالثاً: نكتب المعادلة

اس - نقطة المنتصف = المسافة

اس - صفر = 6 ← اس = 6

تنبيه / إذا كانت إشارة المنتصف موجبة في التمثيل البياني نكتب في المعادلة إشارة سالبة والعكس

حل معادلات القيمة المطلقة

حل المعادلتين التالية ومثلها بيانياً

$$1 = |3+|$$


عند حل معادلة تتضمن قيمة مطلقة يكون هناك حالتان

الحالة الأولى: ف + 3 = 1

$$\text{بطرح 3 من الطرفين} \quad \text{ف} + 3 = 1 \quad \text{ف} = 1 - 3 \quad \text{ف} = -2$$

الحالة الثانية: ف + 3 = -1

$$\text{بطرح 3 من الطرفين} \quad \text{ف} + 3 = -1 \quad \text{ف} = -1 - 3 \quad \text{ف} = -4$$



$$3- = |1-|$$

ب - 3 = 1 تعني أن المسافة بين ب و 3

تساوي 3- وبما أنه لا يمكن أن تكون المسافة

سالبة فإن مجموعة حل هذه المعادلة هي

المجموعة الخالية

العبارات الجبرية التي تتضمن القيمة المطلقة

أحسب قيمة م + 4 - 3

إذا كانت م = 5

الحل:

$$3- |4+| م$$

$$3- |4+5| =$$

$$3- |9| =$$

$$3- 9 =$$

$$6 =$$

الفصل الثاني

العلاقات والدوال الخطية

٢-١ العلاقات

٢-٢ الدوال

٢-٣
تمثيل المعادلات الخطية بيانياً

٢-٤
حل المعادلات الخطية بيانياً

٢-٥ معدل التغير والميل

٢-٦
المتتابعات الحسابية كدوال خطية

تذكر:




حل المعادلات
بمتغيراً أو بمتغيرين

١-٢ العلاقات


ماذا سأتعلم؟

- ✓ أمثل العلاقات
- ✓ أفسر التمثيل البياني للعلاقات




العلاقة تمثل بأحد التمثيلات الآتية

مخطط سهلي



تمثيل بياني



جدول

ص	س
٢	١
٤	٢
٣	٠

أزواج مرتبة

(٢، ١)

(٣، ٠)

(٤، ٢)

وبما أن قيم س في العلاقة هي عناصر المجال وقيم ص هي عناصر المدى فإن المجال في العلاقة

هو { ١، ٢، ٤ } والمدى هو { ٠، ٢، ٤ }



المتغير المستقل والمتغير التابع

حدد كلاً من المتغير المستقل والمتغير التابع في العلاقة التالية: يزداد ضغط الهواء داخل إطار السيارة مع ازدياد درجة الحرارة

المتغير المستقل / درجة الحرارة


المتغير التابع / ضغط الهواء داخل الإطار ١٧



التمثيل البياني للعلاقات

يوضح التمثيل البياني المسافة التي يقطعها فهد بدراجته

ركوب الدراجة



الهوائية، صف هذا التمثيل؟

تزداد المسافة بازدياد الزمن حتى يصبح الخط أفقياً

حيث يزداد الزمن مع بقاء المسافة ثابتة مما يعني

أن فهد قد توقف في هذه المرحلة

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحدد ما إذا كانت العلاقة دالة أم لا
- ✓ نوجد قيم الدالة

٢-٢ الدوال

تذكر:





العلاقات وتمثيلها وتفسيرها


الدالة: هي علاقة تربط كل عنصر في مجالها بعنصر واحد فقط في المدى

هل تمثل كل علاقة فيما يأتي دالة أم لا؟

المجال المدى



س	١	٣	٥	١
ص	٤	٣	٥	٤



كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد فقط في المدى إذا يمثل دالة

باستعمال اختبار الخط الرأسي نجد أنه يقطع التمثيل البياني في أكثر من نقطة إذا لا يمثل دالة

ارتبط العنصر (١) في المجال بعنصرين ٤، -٤ في المدى لذا فإنه يوجد أكثر من قيمة ممكنة ل ص عند س = ١ إذا لا يمثل دالة

باستعمال اختبار الخط الرأسي نجد أنه يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة إذا يمثل دالة

الدالة المتصلة: الدالة التي تمثل بيانياً بخط أو منحنى دون انقطاع
الدالة المنفصلة: الدالة التي تمثل بيانياً بنقاط غير متصلة

تمثل الدالة بأربع طرق: جدول - مخطط سهمي - تمثيل بياني (كما في الدرس السابق)
معادلة مثل د(س) = ٤س - ٨

وتذكر: أن المعادلة تمثيل للعلاقة فإذا كانت العلاقة دالة فإن المعادلة تمثل دالة

الدالة التي يختلف أس متغيرها عن العدد ١ تسمى دالة غير خطية وتمثيلها البياني ليس خط مستقيم

الدالة الغير خطية

إذا كانت د(س) = ٣س + ٤ أوجد: د(٢)

$$\begin{aligned} \text{د(٢)} &= ٣(٢) + ٤ \\ &= ٦ + ٤ \\ &= ١٠ \end{aligned}$$

إيجاد
قيم
الدالة

الدالة الخطية

إذا كانت د(س) = ٥س + ٢ أوجد: د(٢)

$$\begin{aligned} \text{د(٢)} &= ٥(٢) + ٢ \\ &= ١٠ + ٢ \\ &= ١٢ \end{aligned}$$



تذكر:

حل المعادلات ذات
الخطوة الواحدة

٢-٣ تمثيل المعادلات الخطية بيانياً

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل معادلات متعددة الخطوات
- ✓ أحل المعادلات التي تتضمن أعداد صحيحة مثاليه



المعادلة الخطية هي المعادلة التي تمثل بيانياً بخط مستقيم وتكتب على الصورة
أس + ب ص = ج ، تمثل أس ، ب ص حدود جبرية بينما ج يمثل الحد الثابت

حدد إذا كانت المعادلة التالية خطية أم لا وإذا كانت كذلك
اكتبها بالصورة القياسية : ص = ٣ - ٤

$$\text{ص} + ٣ = ٣ - ٤$$

$$\text{ص} + ٣ = ٣ - ٤ \quad \text{على الصورة القياسية وفيها } ٣ = ١ = ج ، ٤ = ٤$$

$$\text{ص} - ٦ = ٣ - ٤$$

بما أن الحد ص فيه متغيران فلا يمكن كتابة المعادلة على
الصورة أس + ب ص = ج لذا فالمعادلة ليست خطية

تميز المعادلات الخطية

مثل المعادلة ٢ ص + ٤ ص = ١٦ بيانياً باستعمال المقتعين
السيني والصادي

أولاً : لإيجاد المقطع السيني نضع ص = ٠

$$١٦ = ٢ ص + ٤ ص \quad ١٦ = ٠ + ٤ ص$$

ص = ٨ ، أي أن المستقيم يقطع محور

السينات في النقطة (٠ ، ٨)


ثانياً : لإيجاد المقطع الصادي نضع ص = ٠

$$١٦ = ٢ ص + ٤ ص \quad ١٦ = ٤ ص + ٠$$

ص = ٤ ، أي أن المستقيم يقطع محور

الصادات في النقطة (٤ ، ٠)

نعيّن هاتين النقطتين في المستوى الإحداثي
ثم نصل بينهما بخط مستقيم




تمثيل المعادلات
بيانياً باستعمال المقتعين
السيني والصادي

مثل المعادلة ٢ ص - ٢ ص = ٢ بيانياً

أولاً : نكتب المعادلة بدلالة ص ،

$$\text{ص} = ٢ - ٢ ص$$

ثانياً : نختار قيم للمجال ص ونتتج لنا
قيم ص ونكوّن جدول لتتج لنا أزواج
مرتبة نمثلها بيانياً



١	٠	١ -	ص
٠	٢ -	٤ -	ص

التمثيل البياني بتكوين جدول



تذكر:

حل المعادلات ذات
الخطوة الواحدة

٢-٤ حل المعادلات الخطية بيانياً

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل معادلات متعددة الخطوات
- ✓ أحل المعادلات التي تتضمن أعداد صحيحة متتالية



الدالة الخطية: هي دالة تمثل بيانياً بمستقيم

د(س) = س أبسط دالة خطية وتسمى الدالة الطولية الأم لمجموعة الدوال الخطية

حل المعادلة (الجذر): هو أي قيمة تجعل المعادلة صحيحة

وللمعادلة الخطية جذر واحد على الأكثر

حل المعادلات الخطية




عدد لانهائي من الحلول

حل المعادلة التالية جبرياً وبيانياً:

$$س - ٢ = ٢$$

هذا يعني أن قيمة س ثابتة
عند العدد ٢ - مهما تغيرت
قيمة د(س) وفي هذه الحالة
يكون الحل عدد لانهائي من
الحلول وتمثيلها خط مستقيم
يقطع المحور س في ٢ -
ويوازي المحور ص



تمثيلها بيانياً مستقيم موازي
للمحور الصادي


مستحيلة الحل

حل المعادلة التالية جبرياً وبيانياً:

$$٢س - ٤ = ٢س - ٦$$

$$\begin{aligned} \text{نعيد كتابة الدالة} \\ ٢س - ٤ = ٦ + ٤ - ٢س - ٦ \\ ٢س - ٤ = ٢س - ٢ \\ ٢س - ٢س = ٢ - ٤ \\ ٠ = ٢ \end{aligned}$$

وهذا مستحيل وتكون الدالة
المرتبطة د(س) = ٢ وبما أن جذر
المعادلة الخطية هو س
عند ما يكون د(س) = ٠
وحيث أن د(س) = ٢ دائماً فليس
للمعادلة حل



تمثيلها بيانياً مستقيم موازي
للمحور السيني

حل وحيد

حل المعادلة التالية جبرياً وبيانياً:


$$٣س + ١ = ٢ - ٣$$

أولاً: نعيد كتابة الدالة بحيث
يكون طرفها الأيسر صفر
 $٣س + ١ = ٢ - ٣$
 $٣س + ١ - ١ = ٢ - ٣ - ١$
 $٣س = ٣ - ٤$
 $٣س = -١$

وبذلك تكون الدالة المرتبطة
د(س) = ٣س + ١
ثانياً: نكون جدول

س	د(س) = ٣س + ١	د(س) = ٢ - ٣	د(س) = ٢ - ٣
٢ -	د(٢ -) = ٣(٢ -) + ١ = ٦ - ٣ + ١ = ٤ -	٣ -	(٢ -، ٢ -)
٠	د(٠) = ٣(٠) + ١ = ١	٣	(٣، ٠)

ثالثاً: نمثل بيانياً



تمثيلها بيانياً مستقيم مائل

تذكر:



تمثيل الانواع المرتبة
في المستوى الإحداثي

٢-٥ معدل التغير والميل

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أستعمل معدل التغير لحل المسائل
- ✓ أوجد ميل المستقيم



حدد ما إذا كانت كل دالة فيما يأتي خطية أم لا، وفسر إجابتك

معدل التغير =

$$\epsilon = \frac{10 - 19}{1 - (-2)} = \frac{-9}{3} = -3, \quad \epsilon = \frac{11 - 10}{3 - (-2)} = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$\epsilon = \frac{23 - 27}{1 - 2} = \frac{-4}{-1} = 4, \quad \epsilon = \frac{19 - 23}{(-1) - 1} = \frac{-4}{-2} = 2$$

ص	س
١١	٣-
١٥	٢-
١٩	١-
٢٣	١
٢٧	٢

معدل التغير =

المعدل غير ثابت إذا الدالة ليست خطية

$$\frac{0}{3-} = \frac{1-6}{9-6}, \quad \frac{0}{3-} = \frac{(4-)-1}{12-9}$$


$$\frac{0}{3-} = \frac{11-16}{3-0}, \quad \frac{0}{3-} = \frac{6-11}{6-3}$$

ص	س
٤-	١٢
١	٩
٦	٦
١١	٣
١٦	٠


المعدل ثابت إذا الدالة خطية

معدل التغير =


التغير في ص
التغير في س




الميل موجب



الميل سالب



الميل = صفر



الميل غير معرف

أوجد ميل المستقيم المار بكل نقطتين من النقاط التالية
(٤، ٤)، (٢، ١)

$$\text{الميل} = \frac{4 - 1}{4 - 2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{الميل} = \frac{3 - 2}{0 - 2} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{الميل} = \frac{3 - 1}{2 - 2} = \frac{2}{0} = \text{غير معرف}$$

$$\text{الميل} = \frac{3 - 2}{2 - 2} = \frac{1}{0} = \text{غير معرف}$$

$$\text{الميل} = \frac{3 - 1}{2 - 2} = \frac{2}{0} = \text{غير معرف}$$

$$\text{الميل} = \frac{3 - 2}{1 - 2} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\text{الميل} = \frac{3 - 2}{3 - 3} = \frac{1}{0} = \text{غير معرف}$$



الميل =

ص ٢ - ص ١
س ٢ - س ١

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أميز المتتابعات الحسابية
- ✓ أمثل المتتابعات الحسابية بدوال خطية

٢-٦ المتتابعات الحسابية كدوال خطية

تذكر:

الدوال الخطية



المتتابعة الحسابية

هي نمط عددي يزيد أو ينقص بمقدار ثابت يسمى هذا المقدار أساس المتتابعة وترمز له بالرمز d

٣٣، ٢٩، ٢٥، ٢١، ١٧، ...

متتابعة حسابية متناقصة وفيها الأساس $d = -٤$

٣، ٥، ٧، ٩، ١١، ...

متتابعة حسابية متزايدة وفيها الأساس $d = ٢$

إيجاد الحد التالي

في المتتابعة ١٥، ٩، ٣، -٣، -٩، ...

$d = \text{الحد الثاني} - \text{الحد الأول} = ٩ - ١٥ = -٦$
نضيف d إلى الحد الأخير كل مرة فتكون الحدود الثلاثة التالية هي: -٩، -١٥، -٢١

تميز المتتابعة الحسابية

تكون المتتابعة حسابية إذا كان الفرق بين كل حد والحد الذي يليه ثابت مثل

٤ - ٢ = ٢
٢ - ٠ = ٢
٠ - ٢ = -٢

إيجاد الحد النوني

يُعبّر عن الحد النوني لمتتابعة حسابية حدها الأول a وأساسها d بالصيغة
 $a_n = a + (n-1)d$ ، حيث n عدد صحيح موجب مثلاً

أوجد الحد العاشر في المتتابعة؟


نعوض عن n بالعدد ١٠

$$a_{10} = ١٦ + ٩(-٤)$$

$$a_{10} = ١٦ - ٣٦ = -٢٠$$

$$a_{10} = ١٦ - ٤٠ = -٢٤$$

مثل الحدود الخمسة الأولى بيانياً



اكتب معادلة الحد النوني للمتتابعة الحسابية -١٢، ٨، -٤، ٠، ...

نوجد الأساس $d = \text{الحد الثاني} - \text{الحد الأول}$

$$d = -١٢ - ٨ = -٢٠$$

وحيث أن $a = ١٢$ نعوض عن قيمة a و d في القانون

$$a_n = ١٢ + (n-1)(-٢٠)$$

$$= ١٢ - ٢٠(n-1)$$

$$= ١٢ - ٢٠n + ٢٠$$

الفصل الثالث الدوال الخطية

٣-١ تمثيل المعادلات المكتوبة
بصيغة الميل والمقاطع بيانياً

٣-٢ كتابة المعادلات بصيغة
الميل والمقطع

٣-٣ كتابة المعادلات بصيغة
الميل نقطة

٣-٤ المستقيمات والمتوازية
والمستقيمات المتعامدة




تذكر:

معدل التغير والميل


٣-١ تمثيل المعادلات المكتوبة بصيغة الميل والمقطع بياناتياً

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أكتب معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع وأمثلها بياناتياً
- ✓ أمثل بيانات من واقع الحياة باستعمال معادلات مكتوبة بصيغة الميل والمقطع



أكتب معادلة المستقيم الذي ميله $\frac{3}{4}$ ومقطعه الصادي -2 ثم مثلها بياناتياً



$$\text{ص} = \frac{3}{4} \text{ م} - 2$$

ولتمثيلها بياناتياً تتبع الخطوات التالية :

أولاً: نحدد المقطع الصادي وهو $(-2, 0)$

ثانياً: نستخدم الميل رأسياً وأفقياً حسب الإشارات

التحرك للأعلى ثلاث خطوات لأنه موجب $\frac{3}{4}$
التحرك لليمين أربع خطوات لأنه موجب $\frac{4}{4}$

المستقيمات الرأسية

الميل غير معرف

المعادلة لا يمكن كتابتها بصيغة الميل والمقطع


المستقيمات الأفقية

الميل = صفر ، المعادلة $\text{ص} = \text{ب}$

مثل المعادلة $\text{ص} = -3$

أولاً / نحدد المقطع الصادي وهو النقطة $(0, -3)$

ثانياً / ارسم خط أفقي من النقطة $(0, -3)$



استعمل المعلومات الواردة عن عدد طالبات المرحلة

الثانوية في المملكة

بلغ عدد طالبات المرحلة الثانوية لعام ١٤٠١ هجري نحو ٤٢ ألف

طالبه وقد ازداد هذا العدد بمعدل ١٧ ألف طالبة تقريباً كل سنة

حيث بلغ عدد الطالبات عام ١٤٢١ هجري ٣٨٦ ألف تقريباً

أ / اكتب معادلة خطية لإيجاد عدد طالبات المرحلة الثانوية

بعد عام ١٤٠١ هجري

عدد الطالبات = معدل التغير $\times$ عدد السنوات + العدد في البدايه

$\text{ص} = \text{عدد الطالبات}$ ، $\text{م} = \text{عدد السنوات منذ عام ١٤٠١ هجري}$

$$\text{ص} = ١٧ \text{ م} + ٤٢$$



تذكر:

تمثيل مستقيم علم ميله ومقطعه الصادي

٣-٢ كتابة المعادلات بصيغة الميل والمقطع

ماذا سأتعلم؟

- أكتب معادلة مستقيم علم ميله ونقطة يمر بها بصيغة الميل والمقطع
- أكتب معادلة مستقيم علمت إحداثيات نقطتين يمر بهما بصيغة الميل والمقطع



أكتب معادلة المستقيم الذي ميله 3 ومقطعه الصادي 0

$$\begin{aligned} 3 &= m & 0 &= b \\ \text{ص} &= m \text{ س} + b \\ \text{ص} &= 3 \text{ س} + 0 \end{aligned}$$

بمعرفة الميل والمقطع



أكتب معادلة المستقيم امار بالنقطة $(6, 4)$ وميله 0 ؟

أولاً: نوجد المقطع الصادي من القانون $\text{ص} = m \text{ س} + b$

$$4 = 0 \times 6 + b \leftarrow b = 4$$

ثانياً: نكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع

$$\begin{aligned} \text{ص} &= m \text{ س} + b \\ \text{ص} &= 0 \text{ س} + 4 \end{aligned}$$

بمعرفة الميل ونقطة



أكتب معادلة المستقيم امار بالنقطتين $(3, 4)$ ، $(9, 7)$

$$\text{أولاً: نوجد الميل} \quad m = \frac{7 - 4}{9 - 3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

ثانياً: نوجد المقطع الصادي باستعمال الميل وأحدى النقطتين

$$4 = m(3) \quad m = \frac{1}{2}$$

$$\text{ص} = m \text{ س} + b$$

$$4 = \frac{1}{2} \times 3 + b$$

$$8 = 3 + 2b \leftarrow 2b = 5 \leftarrow b = \frac{5}{2}$$

ثالثاً: نكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع

$$\text{ص} = m \text{ س} + b$$

$$\text{ص} = \frac{1}{2} \text{ س} + \frac{5}{2}$$

بمعرفة نقطتين عليه



تذكر:



كتابة المعادلات الخطية
إذا علم الميل ونقطة
أو علمت نقطتان


ماذا سأتعلم؟

- ✓ أكتب معادلات خطية بصيغة
الميل ونقطة
- ✓ أكتب معادلات خطية بصيغ
مختلفة



٣-٣ كتابة المعادلات بصيغة الميل ونقطة

كتابة المعادلات بصيغة الميل ونقطة إذا علمت الميل وإحداثيات نقطة يمر بها المستقيم



أكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢، ١) وميله $\frac{1}{3}$ ومثله بيانياً؟

$$(ص - ص_1) = م (س - س_1)$$

$$(ص - ٢) = \frac{1}{3} (س - ١)$$

التمثيل البياني / أعيى النقطة (٢، ١) ثم استعمل الميل لإيجاد
نقطة أخرى وأصل بينهم بخط مستقيم

إعادة كتابة معادلات مكتوبة بصيغة الميل ونقطة إلى معادلات مكتوبة

بصيغة الميل والمقطع

$$ص = م س + ب$$

مثلاً: أكتب المعادلة $ص + ٦ = ٤ (س - ٢)$

بصيغة الميل والمقطع

$$ص = ٦ + ٤ (س - ٢)$$

خاصية التوزيع

$$ص + ٨ = ٦ + ٤ س$$

أطرح ٦ من الطرفين

$$ص = ٤ س - ١٤$$

بالصيغة القياسية

$$أ س + ف ص = ج$$

مثلاً: أكتب المعادلة $٥ - ٤ = ٣ (س - ٣)$

بالصيغة القياسية

$$ص - ٥ = ٤ (س - ٣)$$

خاصية التوزيع

$$ص - ٥ = ٤ س - ١٢$$

أضف ٤ للطرفين

$$ص = ٤ س - ١١$$

أطرح ٥ من الطرفين

$$ص = ٤ س - ١١$$

ماذا سأتعلم ؟


- أكتب معادلة مستقيم امار
- بنقطة معطاة ويوازي مستقيم معلوم
- أكتب معادلة المستقيم
- الامار بنقطة معطاة ويعامد مستقيم معلوم

٣-٤ المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

تذكر:



كتابة المعادلات الخطية بصيغة الميل ونقطة



ميل كل منهما
معكوس مقلوب
الأخر مثل $m=3$
 $\frac{1}{3} = -2$




المستقيمان
المتعامدان

هما المستقيمان
الذان يتقاطعان
مكونين زاوية
قائمة



المستقيمان
المتوازيان

هما المستقيمان
الواقعان في
المستوى نفسه
ولا يتقاطعان



متوازيان لهما
الميل نفسه
مثل $m=3$
 $m=3$

لكن نحدد المستقيمات المتوازية أو المتعامدة :
١- نضع المعادلات على صيغة الميل والمقطع ، ٢- نقارن بين الميلين في كلا المعادلتين



المستقيم امار بنقطة معطاة ويعامد مستقيم معلوم

أكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة مستقيم مار بالنقطة
(٤، ٦) ومعامد للمستقيم $2x + 3y = 12$

أولاً : أوجد ميل المستقيم المعطى بإيجاد قيمة m

$$2x + 3y = 12 \Rightarrow 3y = -2x + 12 \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 4$$

$$3y = -2x + 12 \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 4$$

ثانياً : ميل المستقيم المعامد للمستقيم المعطى هو معكوس
مقلوب العدد $2/3$ أي $3/2$ ومنها نوجد معادلة

$$\text{المستقيم العمودي } y - 4 = \frac{3}{2}(x - 4) \Rightarrow y - 4 = \frac{3}{2}x - 6 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x - 2$$

$$y - 4 = \frac{3}{2}(x - 4) \Rightarrow y - 4 = \frac{3}{2}x - 6 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x - 2$$



المستقيم امار بنقطة معطاة ويوازي مستقيم معلوم

أكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة مستقيم مار بالنقطة
(٣، ٥) وموازي للمستقيم $2x - 3y = 4$

أولاً : بما أن ميل المستقيم $2x - 3y = 4$ يساوي ٢ فإن ميل
المستقيم الموازي له يساوي ٢

ثانياً : نوجد المعادلة العامة للمستقيم بصيغة الميل ونقطة

$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y - 5 = 2x - 6 \Rightarrow y = 2x - 1$$

$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y - 5 = 2x - 6 \Rightarrow y = 2x - 1$$

$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y - 5 = 2x - 6 \Rightarrow y = 2x - 1$$

$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y - 5 = 2x - 6 \Rightarrow y = 2x - 1$$

$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y - 5 = 2x - 6 \Rightarrow y = 2x - 1$$

$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y - 5 = 2x - 6 \Rightarrow y = 2x - 1$$

$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y - 5 = 2x - 6 \Rightarrow y = 2x - 1$$


خاصية التوزيع



المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

حدد إذا كان التمثيل البياني أمامك للمستقيمات التالية متوازية أو
متعامدة ؟ وفسر إجابتك $5x - 3y = 1$ ، $3x - 5y = 1$

نمثل كل معادله في المستوى الاحداثي ،
ومن التمثيل البياني يمكنك ملاحظة ان
المستقيم $5x - 3y = 1$ يوازي محور السينات
وان المستقيم $3x - 5y = 1$ يوازي محور
الصادات لذا فهما متعامدان ولايتوازي
اي مستقيمين من الثلاثة



ميل المستقيمين المتعامدين

في المربع الذي أمامك حدد ما إذا كان القطران فه ول ي

متعامدان ام لا ؟

نوجد ميل المستقيم فه امار بالنقطتين


$$(4, -4) \text{ و } (3, 3) \text{ ونجد أن } m = 1$$

ثم نوجد ميل المستقيم ل ي امار بالنقطتين

$$(4, -3) \text{ و } (3, 4) \text{ ونجد أن } m = -1$$

بما أن $m = 1$ معكوس مقلوب $m = -1$

إذاً المستقيمان متعامدان



الفصل الرابع

المتباينات الخطية

٤-١ حل المتباينات
بالجمع أو بالطرح

٤-٢ حل المتباينات
بالضرب أو بالقسمة

٤-٣ حل المتباينات
المتعددة الخطوات

٤-٤ حل المتباينات المركبة

٤-٥ حل المتباينات
التي تتضمن القيمة المطلقة

تذكر:



حل معادلات خطية
باستعمال الجمع والطرح

٤-١ حل المتباينات بالجمع أو الطرح

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل متباينة خطية باستعمال الجمع
- ✓ أحل متباينات خطية باستعمال الطرح




الحل بالطرح



حل المتباينة $ص + ٩ > ١٦$ وتحقق من صحة الحل

$$\begin{aligned} ص + ٩ > ١٦ \\ ص > ٧ \end{aligned}$$

مجموعة الحل (كل الأعداد الأقل من ٧)
للتحقق / نعوض عن $ص$ في المتباينة الأصلية بثلاثة
أعداد مختلفة على أن يكون أحدها ٧ والعدد الثاني
أكبر من ٧ والعدد الثالث أصغر من ٧



التمثيل على
خط الأعداد


الحل بالجمع



حل المتباينة $ص - ١ \leq ٢$ وتحقق من صحة الحل

$$\begin{aligned} ص - ١ \leq ٢ \\ ص \leq ٣ \end{aligned}$$

مجموعة الحل {كل الأعداد الأكبر من أو تساوي ٣}
للتحقق / نعوض عن $ص$ في المتباينة الأصلية بثلاثة أعداد
مختلفة على أن يكون أحدها ٣ والعدد الثاني أكبر من ٣
والعدد الثالث أصغر من ٣



التمثيل على
خط الأعداد

الصفة المميزة للمجموعة هي الطريقة المختصرة لكتابة مجموعة الحل وتكتب بالطريقة {ص / ص}
تفسير رموز المتباينات : $<$ أكبر من ، أكثر من ، $>$ أصغر من ، أقل من
 $\leq$ أكبر من أو يساوي على الأقل ، لا يقل عن ، $\geq$ أقل من أو يساوي على الأكثر ، لا يزيد على

المتباينة وحل



المسائل

أضاف أحمد ٢٠ كتاباً جديداً إلى مكتبته فأصبح
لديه أكثر من ٦١ كتاباً. فكم كتاباً كان لديه ؟
نفرض أن $ص$ = عدد الكتب في مكتبة أحمد أصلاً
المتباينة : $ص + ٢٠ < ٦١$
 $ص < ٤١$ بطرح (٢٠) من الطرفين
مجموعة الحل هي {ص / ص < ٤١}
أي أنه كان في المكتبة أكثر من ٤١ كتاباً

المتغير في طرفي



المتباينة

حل المتباينة $٦ص < ٣ص + ٩$
ثم مثل مجموعة حلها بيانياً على خط الأعداد
 $٦ص < ٣ص + ٩$
 $٦ص - ٣ص < ٩ - ٣ص$ بطرح $٣ص$ من الطرفين
 $٣ص < ٩$
 $ص < ٣$
مجموعة الحل هي كل الأعداد الأكبر من ٣



التمثيل على
خط الأعداد



تذكر:

حل معادلات باستعمال
الضرب أو القسمة

٤-٢ حل المتباينات بالضرب أو القسمة

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل متباينات خطية باستعمال الضرب
- ✓ أحل متباينات خطية باستعمال القسمة



في عدد سالب

$$\begin{aligned} & -\frac{3}{6} \leq ص \\ & \left(-\frac{6}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{6}\right) \leq \left(-\frac{6}{3}\right) \times ص \\ & 10 \leq ص \leftarrow \text{اضربنا في - عكسنا إشارة التباين} \\ & \text{مجموعة الحل هي } \{ص | ص \leq 10\} \end{aligned}$$



الضرب

في عدد موجب

$$\begin{aligned} & \frac{2}{0} < س \\ & \left(\frac{0}{2}\right) \times \frac{2}{0} < \left(\frac{0}{2}\right) \times س \\ & 10 < س \leftarrow \\ & \text{مجموعة الحل هي } \{س | س < 10\} \end{aligned}$$

على عدد سالب

$$\begin{aligned} & 4- < ج \\ & \frac{4-}{4-} > \frac{4-}{4-} \\ & 3 > ج \leftarrow \\ & \text{مجموعة الحل هي } \{ج | ج > 3\} \end{aligned}$$



القسمة

على عدد موجب

$$\begin{aligned} & 30 > م \\ & \frac{30}{7} > \frac{30}{7} \\ & 0 > م \leftarrow \\ & \text{مجموعة الحل هي } \{م | م > 0\} \end{aligned}$$

إذا ضرب أو قسم طرفاً متباينة في أو على عدد سالب فإنه يتعين تغيير اتجاه إشارة المتباينة لجعل المتباينة الناتجة صحيحة

جمعت دار نشر أكثر من ٣٦٠٠ ريال من بيع كتاب جديد ،
 ثمن النسخة الواحدة ١٥ ريالاً
 أكتب متباينة تمثل عدد الكتب المطبوعة ثم حلها وفسر الحل
 لتكن $ك$ عدد الكتب المطبوعة
 المتباينة $١٥ \leq ك$ ٣٦٠٠
 $ك < ٢٤٠$ بالقسمة على (١٥)
 أي أن عدد الكتب المطبوعة على الأقل ٢٤٠ كتاب



كتابة

متباينة الضرب
أو القسمة وحلها



تذكر:

حل معادلات متعددة الخطوات

٤-٣ حل المتباينات المتعددة الخطوات

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل متباينة خطية تتضمن أكثر من عملية واحدة
- ✓ أحل متباينة خطية تتضمن خاصية التوزيع



متباينة تتضمن معامل سالب



حل المتباينة التالية: $9 - 6 \leq 3$

$$9 - 6 \leq 6 - 6 \quad 3 \leq 0$$

$$\frac{9}{9} \geq 0 \quad \leftarrow \quad 9 \leq 0$$

$0 \geq 1$ مجموعة الحل هي $\{0 | 0 \geq 1\}$

متباينة تتضمن معامل موجب



حل المتباينة التالية: $5 + 7 > 22$

$$5 + 7 > 22 - 7 \quad 12 > 15$$

$$\frac{10}{0} > 3 \quad \leftarrow \quad 10 > 0$$

$3 > 3$ مجموعة الحل هي $\{3 | 3 > 3\}$

كتابة متباينة متعددة الخطوات وحلها



اكتب المتباينة ثم حلها: ثلاثة أمثال عدد مضاف إليه خمسة أصغر من ثمانية؟

$$3 + 5 > 8$$

$$3 + 5 > 8 - 5 \quad 3 > 3$$

$3 > 3$ مجموعة الحل هي $\{3 | 3 > 3\}$

متباينة تتضمن خاصية التوزيع



حل المتباينة التالية: $3(5 - 2) > 24$

$$15 - 6 > 24$$

$$15 - 6 > 24 - 6 \quad 9 > 18$$

$$\frac{30}{10} > 3 \quad \leftarrow \quad 30 > 3$$

$2 > 2$ مجموعة الحل هي $\{2 | 2 > 2\}$

المجموعة الخالية ومجموعة جميع الأعداد الحقيقية



$$6(2 - 5) \geq 4(3 + 1)$$

$$12 - 30 \geq 4 + 12$$

$$-18 \geq 16$$

$-18 \geq 16$ ، بما أن نتيجة الحل عبارة

غير صحيحة أبداً فإن مجموعة حل هذه

المتباينة هي المجموعة الخالية $\emptyset$

حل المتباينات التالية

وتحقق من صحة الحل

$$(3 - 2) \leq (4 - 12)$$

$$1 \leq -8$$

$$1 \leq -8$$

$1 \leq -8$ ، بما أن نتيجة الحل

صحيحة دائماً فإن مجموعة حل هذه المتباينة

هي مجموعة الأعداد الحقيقية

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل متباينات مركبة تحتوي أداة الربط (و) وأمثلة مجموعة حلها بيانياً
- ✓ أحل متباينات مركبة تحتوي أداة الربط (أو) وأمثلة مجموعة حلها بيانياً



تذكر:

حل معادلات تتضمن القيمة المطلقة

٤-٤ حل المتباينات المركبة

المتباينات التي تحتوي أداة الربط (و) ويسمى التقاطع

$$2 \leq 4 + q < 7$$

أكتب هذه المتباينة في صورة متباينتين باستعمال (و) ثم نحل كلا المتباينتين


$$2 \leq 4 + q \quad \text{و} \quad 4 + q < 7$$

$$-2 \leq q < 3$$

$$-2 \leq q \quad \text{و} \quad q < 3$$

مجموعة الحل هي $\{q \mid -2 \leq q < 3\}$

التمثيل البياني



المتباينات التي تحتوي أداة الربط (أو) ويسمى الاتحاد

$$s + 3 < 5 \quad \text{أو} \quad s + 3 \geq 12$$


بما أنها مكتوبة في صورة متباينتين باستعمال (أو) نحل كلا المتباينتين

$$s + 3 < 5 \quad \text{أو} \quad s + 3 \geq 12$$

$$s < 2 \quad \text{أو} \quad s \geq 9$$

مجموعة الحل $\{s \mid s < 2 \text{ أو } s \geq 9\}$

التمثيل البياني



كتابة المتباينات المركبة و تمثيلها بيانياً

$$-8 < 3 + u < 10 \quad \text{ناتج جمع ثلاثة أمثال عدد مع أربعة يقع بين -8 و 10}$$


$$-8 < 3 + u \quad \text{و} \quad 3 + u < 10 \quad \text{بطرح 3 من الطرفين}$$

$$-11 < u < 7 \quad \text{و} \quad u < 7 \quad \text{بقسمة الطرفين على 3}$$

$$-11 < u < 7 \quad \text{و} \quad u < 7$$

مجموعة الحل هي $\{u \mid -11 < u < 7\}$

التمثيل البياني





تذكر:

حل معادلات تتضمن
القيمة المطلقة

٤-٥ حل المتباينات التي تتضمن قيمة مطلقة

ماذا سأتعلم؟

- ✓ أحل متباينات القيمة المطلقة $>$ وأمثلها
- ✓ أحل متباينات القيمة المطلقة $<$ وأمثلها



$$| | > \text{ عدد سالب مثل } |ص-١| > -٢$$

لا يمكن أن تكون $|ص-١|$ سالبة وكذلك
لا يمكن أن تكون أقل من -٢ وعليه

لا يوجد حل لهذه المتباينة ومجموعة
حلها في المجموعة الخالية $\emptyset$

متباينات
القيمة
المطلقة $>$

$$| | > \text{ عدد موجب مثل } |م+٢| > ٤$$

الحالة (١) موجبه و الحالة (٢) سالبة


$$م+٢ > ٤ \quad م+٢ < -٤$$

$$م > ٢ \quad م < -٦$$

$$م > ٢ \quad م < -٦$$

$$م > ٢ \quad م < -٦$$

$$\{م > ٢ \text{ أو } م < -٦\}$$



$$| | < \text{ عدد موجب مثل } |ع+١| \leq ١$$

بما أن $|ع+١|$ أكبر من أو تساوي -١
فإن مجموعة حلها في مجموعة الأعداد
الحقيقية ح

متباينات
القيمة
المطلقة $<$

$$| | < \text{ عدد موجب مثل } |س-٣| \leq ١$$

الحالة (١) موجبه أو الحالة (٢) سالبة


$$س-٣ \leq ١ \quad س-٣ \geq -١$$

$$س \leq ٤ \quad س \geq ٢$$

$$س \leq ٤ \quad س \geq ٢$$

$$س \leq ٤ \quad س \geq ٢$$

$$\{س \leq ٤ \text{ أو } س \geq ٢\}$$



استعمال متباينات القيمة المطلقة

تبلغ درجة الحرارة الطبيعة لجسم الشاة السليمة ٣٩° سيليزية ، قد تزيد وتقل بمقدار ١° سيليزية

$$|٣٩-د| \geq ١ \quad \leftarrow \quad ٣٩-د \geq ١ \quad \text{و} \quad ٣٩-د \leq -١$$

$$٤٠ \geq د \quad \text{و} \quad ٣٨ \leq د$$

$$\{د | ٣٨ \leq د \leq ٤٠\}$$



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- مجموعة حل المعادلة $24 - ص = 17$ إذا كانت مجموعة التعويض $\{ 3, 5, 7, 9 \}$ هي :			
٣ (أ)	٥ (ب)	٧ (ج)	٩ (د)
٢- المعادلة التي تمثل متطابقة هي :			
٤ (أ) $2 - 4 = 2 + 4$	٤ (ب) $82 - 14 = 4$	٣ (ج) $23 = 10 + ن$	٤ (د) $2(2 + 4) = 4 + 4$

٢- اكمل الفراغات التالية :

١- الجملة الرياضية التي تحتوي على عبارات جبرية ورموز تسمى **جملة مفتوحة**

٢- المجموعة التي نعوض بها عن قيمة المتغير تسمى **مجموعة التعويض**

٣- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١- باستعمال ترتيب العمليات فإن حل المعادلة $9 \div (2 - 5) = 27$ هو (✓)

٢- حل المعادلة $6 ك + 6 = (12 - 10 \times 3) + 6$ هو ٢٤ (✗)

٤- اوجد حل المعادلة $29 = 3س - 7$ إذا كانت مجموعة التعويض $\{ 11, 12, 13, 14, 15 \}$.

س	$29 = 3س - 7$	صح أم خطأ
١١	$7 - 11 \times 3 = 29$	خطأ
١٢	$7 - 12 \times 3 = 29$	صح
١٣	$7 - 13 \times 3 = 29$	خطأ
١٤	$7 - 14 \times 3 = 29$	خطأ
١٥	$7 - 15 \times 3 = 29$	خطأ

مجموعة حل المعادلة هي $\{ 12 \}$

اختبر نفسك

١-٢ حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة

اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- حل المعادلة $٣٩ = ٣ - ر$ هو :

أ) ١٣	ب) $١٣ -$	ج) ٤٢	د) ٣٦
-------	-----------	-------	-------

٢- حدد المعادلة التي تختلف عن المعادلات الثلاث الأخرى

أ) $٢٧ = ١٤ + ن$	ب) $٢٥ = ن + ١٢$	ج) $٢٩ = ١٦ - ن$	د) $٩ = ٤ - ن$
------------------	------------------	------------------	----------------

٣- الجملة (ستة أمثال عدد تساوي ١٣٢) معادلتها هي :

أ) $١٣٢ = ٦ + س$	ب) $١٣٢ = ٦ س$	ج) $١٣٢ = س - ٦$	د) $١٣٢ = ٦ \div س$
------------------	----------------	------------------	---------------------

٢- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١- حل المعادلة هو إيجاد قيمة المتغير الذي يجعل المعادلة صحيحة (✓)

٢- المعادلات المتكافئة لها الحل نفسه (✓)

٣- حل كلا من المعادلات الآتية و تحقق من صحة حلك :

ق $٦ = ٣٣ -$

ق $٣٣ + ٦ = ٣٣ + ٣٣ -$

ق $٣٩ =$

التحقق من الحل / نعوض
عن قيمة ق في المعادلة

✓ $٦ = ٣٣ - ٣٩$

م $١٢ + ٣ = -$

م $١٢ - ٣ = ١٢ + م -$

م $١٥ = -$

التحقق من الحل / نعوض
عن قيمة م في المعادلة

✓ $١٢ + ١٥ = ٣ -$

ف $\frac{١}{٣} = - ٥$

ف $\frac{١}{٣} = - ٥ (٣)$

ف $١٥ = -$

التحقق من الحل / نعوض
عن قيمة ف في المعادلة

✓ $٥ = - (١٥ -) \frac{١}{٣}$

أول المربي

١-٣ حل المعادلات المتعددة الخطوات

اختبر نفسك



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

٢- حل المعادلة $3س + 4 = 11$ هو :

٣ (أ)	٣ - (ب)	١٥ (ج)	٥ - (د)
---------	-----------	----------	-----------

٣- المعادلة التي تمثل مجموع ثلاث أعداد صحيحة فردية متتالية يساوي ١٤١ هي :

١٤١ = ٣ + ن (أ)	١٤١ = ن + ٣ (ب)	١٤١ = ٦ + ن (ج)	٣ = ٤١١ + ن (د)
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

٤- المعادلة التي تمثل مجموع ثلاث أعداد صحيحة زوجية متتالية يساوي ٨٤ هي :

٨٤ - = ٣ + ن (أ)	٨٤ - = ٦ + ن (ب)	٣ = ٨٤ - ن (ج)	٨٤ - = ٣ + ن (د)
--------------------	--------------------	------------------	--------------------

٢- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١ - المعادلة المتعددة الخطوات تتطلب حلها خطوة واحدة (✗)

٢ - نظرية الأعداد هي دراسة الأعداد الصحيحة والعلاقات بينها (✓)

٤- اكتب معادلة تمثل المسألة الآتية ثم حلها :

تشكل أعمار ثلاثة أخوة أعدادا صحيحة متتالية مجموعها ٩٦ .

نفرض ان عمر الاول = ن ، عمر الثاني = ن + ١ ، عمر الثالث = ن + ٢

$$٩٦ = (٢ + ن) + (١ + ن) + ن$$

$$٩٦ = ٣ + ن$$

$$٣ - ٩٦ = ن$$

$$٩٣ = ن$$

ن = ٣١ ، أعمار الأخوة الثلاثة هي : ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣

٣- حل المعادلة الآتية

$$٨ = \frac{٥ - س}{٧}$$

$$(٧) \quad ٨ = \frac{٥ - س}{٧} \quad (٧)$$

$$٥٦ = ٥ - س$$

$$٦١ = س$$

مجموعة الحل هي { ٦١ }

اختبر نفسك



١-٤ حل المعادلات التي تحتوي متغيراً في طرفيها

١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- حل المعادلة $٥ + ٢ = ٣ - ك$ هو :			
١١- (أ)	٢ (ب)	٤- (ج)	٨ (د)
٢- حل المعادلة $٥ (س - ١) = ٤٠ - ١٠ س$ هو :			
٢ (أ)	٣ (ب)	٤ (ج)	٥ (د)

٢- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١- حل المعادلة $٥ + ٢ = (١ + ل) ٢$ هو ٦

(✗)

٢- اذا احتوت المعادلة أقواساً نستعمل خاصية التوزيع للتخلص منها

(✓)

٣- حل المعادلة الآتية :

$$٨ل - ١٠ = ٣(٦ - ٢ل)$$

$$٨ل - ١٠ = ٣(٦ - ٢ل) \quad \text{فك الأقواس}$$

$$٨ل - ١٠ = ١٨ - ٦ل \quad \text{بإضافة } ٦ل \text{ للطرفين}$$

$$٨ل - ١٠ + ٦ل = ١٨ - ٦ل + ٦ل$$

$$١٤ل - ١٠ = ١٨ \quad \text{بإضافة } ١٠ \text{ للطرفين}$$


$$١٤ل - ١٠ + ١٠ = ١٨ + ١٠$$

$$١٤ل = ٢٨ \quad \text{بقسمة الطرفين على } ١٤$$

$$\frac{١٤ل}{١٤} = \frac{٢٨}{١٤}$$

$$ل = ٢$$

٤- اوجد قيمة س التي تجعل لكل من الشكلين الآتيين المساحة نفسها :



$$\text{مساحة المستطيل الأول} = ١٦(٢ - س)$$

$$\text{مساحة المستطيل الثاني} = ١٢س$$

$$\text{المعادلة هي: } ١٦(٢ - س) = ١٢س$$

$$١٦س - ٣٢ = ١٢س$$

$$١٦س - ٣٢ - ١٢س = ١٢س - ١٢س$$

$$٤س - ٣٢ = ٠ \quad , \quad ٤س = ٣٢$$

اختبر نفسك

١-٥ حل المعادلات التي تتضمن القيمة المطلقة



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- قيمة المقدار $ ن + ٢ - ١٤$ اذا كانت $ن = -٦$ هي :			
أ - ١١	ب - ١٠	ج - ٤	د - ٨
٢- معادلة القيمة المطلقة التي تعبر عن التمثيل البياني هي :			
أ - $ ١١ - س = ١٥$	ب - $ ١٩ - س = ١٥$	ج - $ ١٥ + س = ٤$	د - $ ١٥ - س = ٤$

٢- اكمل الفراغات التالية :

١- حل المعادلة $|ن + ١| = -٣$ هو $\emptyset$

٣- يجب حفظ الادوية عند درجة ٨° س بزيادة او نقصان مقداره ٣° س ، اكتب معادلة لإيجاد درجتي الحرارة العظمى والصغرى اللتين يجب حفظ الدواء عندها .

$|ن - الدرجة الاساسية| = مقدار التزايد والتناقص$

$$|س - ٨| = ٣$$

٤- حل المعادلة $|س - ١| = ٣$ و مثل مجموعة الحل بيانيا .

الحالة الثانية

$$س - ١ = ٣$$

$$س - ١ + ١ = ٣ + ١$$

$$س = ٤$$


الحالة الأولى

$$س - ١ = -٣$$

$$س - ١ + ١ = -٣ + ١$$

$$س = -٢$$

رسل الزبيدي





١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

المدى في العلاقة $\{(6,5), (1,2), (3,4)\}$ هو :			
(أ) $\{1, 2, 4\}$	(ب) $\{5, 1, 3\}$	(ج) $\{6, 1, 3\}$	(د) $\{5, 1, 4\}$

٢- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة :

(✓)	١- يتكون النظام الإحداثي من تقاطع خطي أعداد هما المحور الأفقي والمحور الرأسي
(×)	٢- المتغير التابع هو المتغير الذي يحدد قيم مخرجات العلاقة

٣- حدد المتغير المستقل والمتغير التابع للعلاقة التالية .

كلما قلت كمية المطر انخفض مستوى سطح الماء في النهر.

المتغير المستقل كمية المطر المتغير التابع مستوى سطح الماء في النهر



٤- صف التمثيل البياني الآتي :

يوضح التمثيل البياني المسافة التي قطعها ياسر اثناء الجري

بدأ ياسر بالجري ثم توقف لفترة من الوقت ثم تابع الجري
بالسرعة نفسها .



٥- مثل العلاقة $\{(2,4), (2,1), (3,2)\}$ بجدول وبيانيا ومخطط سهمي وحدد كلا من المجال والمدى .



ص	س
٢	٢
٢	١
٢	٤

المجال هو $\{2, 1, 3\}$ المدى هو $\{4, 1, 2\}$

أسأل الله



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- إذا كانت د (س) = ٤س + ٧ فإن د (٢) = ...	أ- ١	ب- ١	ج- ١٣	د- ١٥
٢- المعادلة التي تمثل دالة هي :	أ- ٢ = س	ب- ٣س - ٢ = ص	ج- ٣س + ٢ = ص	د- ٣ = ٢س + ص

٢- اكمل الفراغات التالية :

١- الدالة التي تمثل بيانيا بنقاط غير متصلة تسمى دالة منفصلة


٢- إذا كانت م (ل) = ٣ - ل فإن م (٣) + ٢ = ٥

٣- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :


١- الدالة هي علاقة تربط كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى (✓)

٢- إذا قطع الخط الرأسي التمثيل البياني في أكثر من نقطة فإنه يمثل دالة (✗)


٤- حدد ما اذا كانت كل علاقة فيما يلي تمثل دالة ام لا وفسر ذلك .




باستعمال الخط الرأسي نجد أنه يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة
إذا يمثل دالة



ارتبط العنصر (٣) في المجال بعنصرين ٢، ٣ في المدى
إذا لا يمثل دالة



باستعمال الخط الرأسي نجد أنه يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة
إذا يمثل دالة



باستعمال الخط الرأسي نجد أنه يقطع التمثيل البياني في أكثر من نقطة
إذا لا يمثل دالة

٢-٣ تمثيل المعادلات الخطية بيانيا

اختبر نفسك



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

(١) واحدة فقط من المعادلات الآتية في صورتها القياسية هي :			
(أ) $٥س + ٣ = ص + ٢$	(ب) $٣ = س + ٢ص$	(ج) $٣ = س - ٢ص$	(د) $٧ - ص = ٣ + س$

٢- اكمل الفراغات التالية :

١- المعادلة التي تمثل بيانيا بخط مستقيم تسمى **دالة خطية**

٢- الإحداثي الصادي للنقطة التي يقطع فيها المستقيم محور الصادات يسمى **المقطع الصادي**

٣- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة :


١- المعادلة $٨ + ص = ٤س$ تمثل معادلة خطية مكتوبة بالصورة القياسية (×)

٢- المقطع السيني للمعادلة الخطية $٥س + ٤ص = ٢٠$ هو ٥ (×)

٥- مثل المعادلة التالية بيانيا بإنشاء جدول

$$٤ = ٢ + ص$$

س	٤ = ٢ + ص	ص	(س، ص)
٢-	$٤ = ٢ + ٢-$	٣	(٣، ٢-)
٠	$٤ = ٢ + ٠$	٢	(٢، ٠)
٢	$٤ = ٢ + ٢$	١	(١، ٢)



٤- مثل المعادلة التالية بيانيا باستعمال المقطعين السيني والصادي

$$٥س + ٣ = ١٥$$

١- لإيجاد المقطع السيني نضع $ص = ٠$

$$٥س + ٣ = ١٥$$


$$٥س = ١٥ - ٣ \quad \text{س} = ٣ \quad (٣، ٠)$$

٢- لإيجاد المقطع الصادي نضع $س = ٠$

$$٥(٠) + ٣ = ١٥$$

$$٣ = ١٥$$

$$ص = ٥ \quad (٠، ٥)$$



أسأل الله

اختبر نفسك

٢-٤ حل المعادلات الخطية بيانيا

١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- حل المعادلة $٤س + ٣ = ٥$ هو :			
أ (٨)	ب (٢)	ج (مجموعة الأعداد الحقيقية)	د (مستحيلة الحل)
٢- حل المعادلة $٤س + ١٦ = ٠$ هو :			
أ (٤)	ب (-٤)	ج (١٢)	د (٢٠)

٢- اكمل الفراغات التالية :

١- قيم $س$ التي تجعل الدالة $د(س) = ٠$ تسمى **أصفار الدالة**

٢- أي قيمة تجعل المعادلة صحيحة تسمى **الجذر أو حل المعادلة**

٤- أراد محمد شراء أقلام لأصدقائه بمبلغ ٥٠ ريالاً والمعادلة $٥٠ = ٢د - ٣س$ تمثل المبلغ ($م$) بالريال المتبقي معه بعد شراء ($د$) قلماً. اوجد صفر الدالة.

نعوض عن القيمة صفراً بدلاً من $م$

$$٥٠ = ٢د - ٣س$$

$$٥٠ - ٥٠ = ٢د - ٣س - ٥٠$$

$$٢٥ = د ، ٥٠ = ٢د - ٣س$$

٣- حل المعادلة الآتية جبرياً وبيانيا :

$$٣ + س = ٠$$

$$\text{الحل جبرياً} / ٣ - ٣ + س = ٣ - ٠$$

$$٣ - س = ٣$$


الحل بيانيا

الدالة المرتبطة هي $د(س) = ٣ + س$

لتمثيل الدالة بيانياً كون جدولاً

س	د (س)	(س، د)
٠	٣	(٣، ٠)
١-	٢	(٢، ١-)

من التمثيل البياني الحل $س = ٣ -$




٥- حل المعادلة $٤س - ٢ = ٠$ بيانياً.

الدالة المرتبطة

$$د(س) = ٤س - ٢$$

س	د (س)
٠	٢ -
١ -	٦ -

الحل بيانياً هو $س = \frac{١}{٢}$





١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :


٢- ميل المستقيم المار بالنقطتين (٠، ١)، (٥، ٢) هو

٥ (أ)	٢ (ب)	٠ (ج)	غير معرف (د)
-------	-------	-------	--------------

٢- من الجدول المجاور فإن معدل التغير هو :

س	٥	٧	٩
ص	٢	١٠	١٨

٢ (أ)	٤ (ب)	٦ (ج)	٨ (د)
-------	-------	-------	-------



٣- نوع الميل في الرسم الممثل امامك هو :

أ) موجب	ب) سالب	ج) صفر	د) غير معرف
---------	---------	--------	-------------

٢- اكمل الفراغات التالية :

١- إذا كان المستقيم أفقيا فإن الميل يساوي **صفر**

٣- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة.

١- معدل التغير هو نسبة تصف معدل تغير كمية بالنسبة لتغير كمية أخرى (✓)

٢- تكون الدالة خطية إذا كان معدل التغير غير ثابتا (×)

٤- أوجد قيمة ر التي تجعل ميل المستقيم المار بالنقطتين (٦، ٢-)، (٤، -٤) يساوي -٥.

$$-٥ = (٢ + ر) - ١٠$$

$$-١٠ = ١٠ - ر - ٥$$

$$-٥ = ر \leftarrow ر = ٠$$

$$م = \frac{ص٢ - ص١}{س٢ - س١}$$

$$-٥ = \frac{٢ - (-٤)}{٦ + ر}$$

$$-٥ = \frac{١٠ - ر}{٦ + ر}$$

٢-٦ المتتابعات الحسابية كدوال خطية

اختبر نفسك



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

٢- الأساس في المتتابعة الحسابية -١٢، -٨، -٤، ٠، هو :			
١- (أ)	٤ (ب)	١٢ (ج)	٢٠ (د)
٢- الحد السابع في المتتابعة الحسابية أن = ٤ ن - ١٦ هو :			
١٠ (أ)	١١ (ب)	١٢ (ج)	١٣ (د)
٣- الحد الذي قيمته (- ١١٤) في المتتابعة الحسابية أن = - ١٣ ن + ١٦ هو :			
١٠ (أ)	١١ (ب)	١٢ (ج)	١٤ (د)

٢- اكمل الفراغات التالية :

١- مجموعة مرتبة من الأعداد تسمى المتتابعة

٢- نمط عددي يزيد أو ينقص بمقدار ثابت تسمى المتتابعة الحسابية

٣- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١- المتتابعة ٣، ٧، ١١، ١٣، ... تمثل متتابعة حسابية (✗)

٢- الفرق بين الحدين المتتاليين في المتتابعة الحسابية يسمى الأساس (✓)

٤- اكتب معادلة الحد النوني للمتتابعة الحسابية ١٢، ٩، ٦، ٣، ... ثم مثل حدودها الخمسة الأولى بيانيا .

الحد الأول للمتابعه أ، هو ١٢


واساسها د هو - ٣

أن = أ + د (١ - ن) معادلة الحد النوني

أن = ١٢ + د (١ - ن) ، أ = ١٢ ، د = - ٣

أن = ١٢ - ٣ ن + ٣ توزيع الضرب على الجمع

أن = - ٣ ن + ١٥




أول النوني



اختبر نفسك

٣-١ تمثيل المعادلات المكتوبة بصيغة الميل والمقطع بيانيا

١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- ميل المستقيم الذي معادلته ٣ س - ص = ١٤ هو :			
أ) ٣	ب) -٣	ج) ١٤	د) -١٤
٢- معادلة المستقيم الممثل في الشكل المجاور هي :			
			
أ) ص = س + ٢	ب) ص = ٢ س	ج) ص - ٢ = ٢ س	د) ص = س - ٢

٢- اكمل الفراغ التالي :

١- المقطع الصادي للمستقيم الذي معادلته ٩ + ص = ٢٥ س هو -٩

٣- اكتب معادلة المستقيم الذي ميله $\frac{4}{7}$ ومقطعه الصادي ٢ بصيغة الميل والمقطع .

$$\text{ص} = \text{م} \text{ س} + \text{ب}$$

$$\text{ص} = \frac{4}{7} \text{ س} + ٢ \quad \text{م} = \frac{4}{7}, \quad \text{ب} = ٢$$

٤- مثل المعادلة ٤ س + ٣ ص = ١٢ بيانيا .

كتابة المعادلة بصيغة ميل ومقطع

$$٣ \text{ ص} = -٤ \text{ س} + ١٢$$


$$\text{ص} = \frac{-٤}{٣} \text{ س} + ٤ \quad \text{الميل} = \frac{-٤}{٣}, \quad \text{المقطع الصادي} = ٤$$

١- حدد المقطع الصادي وهو (٤, ٠)

٢- نستخدم الميل رأسيا وأفقيا حسب الإشارات لإيجاد نقطة أخرى

← $\frac{-٤}{٣}$ التحرك للأسفل أربع خطوات لأنه سالب

← التحرك لليمين ثلاث خطوات لأنه موجب





١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- معادلة المستقيم المار بالنقطة (٠، ٣) وميله ١ بصيغة الميل والمقطع هي :			
أ) $ص = -٣ - س$	ب) $ص = س + ٣$	ج) $ص = -٣ - س - ١$	د) $ص = ٣ - س - ١$
٢- معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٢، ٤) (٤، ٨) هي :			
أ) $ص = ٢ + س$	ب) $ص = ٢ - س$	ج) $ص = ٢ + س - ٢$	د) $ص = س - ٢$

٢- اكمل الفراغ التالي :

١- استعمال المعادلة الخطية لإجراء تنبؤات حول القيم التي تتجاوز مدى البيانات تسمى **التنبؤ الخطي**

٢- الصيغة التي كتبت بها المعادلة $ص = ٣ + س + ٤$ هي **صيغة ميل ومقطع**

٣- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١- معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢، ٤) وميله يساوي صفر هي $ص = ٢ - س$ (✗)

٥- يقدم ناد رياضي عرضا للعضوية مقابل ٢٦٥ ريالاً ودروساً في التمارين الرياضية بمبلغ إضافي مقداره ٥ ريالاً لكل درس .

أ - اكتب معادلة تمثل التكلفة الكلية لعضو حضر س درسا .

$$ص = ٥ + ٢٦٥ س$$

ب - إذا كان المبلغ الذي دفعه مالك ٥٠٠ ريال في إحدى السنوات فما عدد دروس التمارين الرياضية التي حضرها .

بالتعويض عن $ص = ٥٠٠$

عدد الدروس = ٤٧ درسا



٤- اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٧، ٣) (٣، ٥) ، بصيغة الميل والمقطع .

$$١ / \text{نوجد الميل} \quad م = \frac{(٣) - (٥)}{(٧) - (٣)} = \frac{-٢}{٤} = -\frac{١}{٢}$$

٢ / نجد المقطع الصادي باستعمال الميل وأحدى النقطتين

$$ص = م + س + ب \quad م = -\frac{١}{٢} \quad (٥، ٣)$$

$$٥ = -\frac{١}{٢} (٣) + ب \quad \leftarrow \quad ٥ = -\frac{٣}{٢} + ب$$

$$ب = ١١$$

٣ / نكتب المعادلة بصيغة ميل ومقطع

$$ص = ٢ - س + ١١$$



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢، -٣) وميله ٦ بصيغة الميل ونقطة هي :			
أ) $ص + ٢ = ٦ (س - ٣)$	ب) $س - ٢ = ٦ + ص$	ج) $ص + ٣ = ٦ (س - ٢)$	د) $س - ٣ = ٦ (ص - ١)$
٢- ميل المستقيم الذي معادلته $ص + ١١ = ٦ - س$ يساوي :			
أ) ٦	ب) ١١	ج) -٦	د) -١١
٣- معادلة المستقيم $ص + ٦ = ٢ (س + ٢)$ بصيغة الميل والمقطع هي :			
أ) $ص = ٢ - س$	ب) $ص = ٢ - س$	ج) $ص = ٢ + س$	د) $ص = ٢ - س$

٢- اكمل الفراغ التالي :

١- الصيغة التي كتبت بها المعادلة : $ص - ٢ = ٣ (س + ٥)$ هي ميل ونقطة

٢- الصيغة التي كتبت بها المعادلة : $ص + ٣ = ٧$ هي الصورة القياسية

٣- اكتشف الخطأ : يكتب كل من أنس وأيمن معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٣، -٧)، (-٦، ٤) بصيغة الميل ونقطة. فأيهما إجابته صحيحة ؟

الإجابة الصحيحة	أيمن	أنس
أيمن	ص - ٤ = $\frac{١١}{٩} (س + ٦)$	ص - ٧ = $\frac{١١}{٩} (س + ٣)$

٥- اكتب المعادلة $ص + ٢ = ٣ (س + ٦)$

بصيغة الميل والمقطع .

المعادلة الأصلية $ص + ٢ = ٣ (س + ٦)$

خاصية التوزيع $ص + ٢ = ٣ + ١٨ + س$

طرح ٢ من الطرفين $ص = ٣ + ١٨ + س - ٢$

ص = ٣ + ١٦

٤- اكتب المعادلة $ص - ٨ = ٢ (س + ٣)$ بالصورة القياسية .

المعادلة الأصلية $ص - ٨ = ٢ (س + ٣)$

خاصية التوزيع $ص - ٨ = ٢ + ٦ + س$

إضافة ٨ للطرفين $ص = ٢ + ٦ + س + ٨$

طرح ٢ من الطرفين $ص = ٢ + ٦ + س + ٨ - ٨$

$ص = ٢ + ٦ + س$

أضرب كل طرف في (-١) $ص - ٢ = ٦ + س$

٣-٤ المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

اختبر نفسك



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- ميل المستقيم المعامد للمستقيم : ص = ٢ - س + ٦ يساوي	٢ (أ)	٦ (ب)	١ (ج)	١٢ (د)
--	---------	---------	---------	----------

٢- اكمل الفراغ التالي :

١- المستقيمان الواقعان في المستوى نفسه و لا يقطع أحدهما الآخر يسميان مستقيمان متوازيان

٢- المستقيمان اللذان يتقاطعان مكونين زوايا قائمة يسميان مستقيمان متعامدان

٣- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١- يكون المستقيمان غير الرأسيين متوازيين اذا كان حاصل ضرب ميليهما يساوي -١ (✗)

٣- اكتشف الخطأ : يحاول فيصل و أسامة إيجاد معادلة المستقيم العمودي على المستقيم ص = $\frac{1}{3}$ س + ٢ و
المرار بالنقطة (٣ ، ٥) فأيهما إجابته صحيحة ؟

الإجابة الصحيحة	أسامة	فيصل
فيصل	ص - ٥ = ٣ [س - (٣ -)] ص - ٥ = ٣ (س + ٣) ص = ٣ + ٩ + ٥ ص = ٣ - ١٤ + س	ص - ٥ = ٣ - [س - (٣ -)] ص - ٥ = ٣ - (س + ٣) ص = ٣ - ٩ + ٥ ص = ٣ - ٤ + س

٥- اكتب بصيغة ميل و مقطع معادلة المستقيم المار
بالنقطة (٢ ، ٣) و المعامد للمستقيم ص = $\frac{1}{4}$ س - ٤ .

بما أن ميل المستقيم ص = $\frac{1}{4}$ س - ٤ يساوي $\frac{1}{4}$ فإن
ميل المستقيم المعامد له يساوي ٢
ص - ١ = ٢ (س - س)
ص - ٢ = ٣ (س - ٢)
ص - ٢ = ٣ - ٤ + س
ص = ٢ - ٣ + ٤
ص = ٢ - ١

٤- اكتب بصيغة ميل و نقطة معادلة المستقيم المار
بالنقطة (١ ، ٢) و الموازي للمستقيم ص = ٢ س - ٣ .

بما أن ميل المستقيم ص = ٢ س - ٣ يساوي ٢ فإن ميل
المستقيم الموازي له يساوي ٢
ص - ١ = ٢ (س - س)
ص - ٢ = ٢ (س - ١)
ص = ٢ - ٢ (س + ١)

أسامة

١-٤ حل المتباينات بالجمع او الطرح

اختبر نفسك




١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- حل المتباينة $س - ٣ < ٧$ هي :

أ) $س < ٤$	ب) $س > ٤$	ج) $س > ١٠$	د) $س < ١٠$
------------	------------	-------------	-------------

٢- يمكن التعبير عن (ناتج جمع عدد و أربعة لا يقل عن ١٠) بالعلاقة الجبرية :

أ) $س - ٤ > ١٠$	ب) $س + ٤ < ١٠$	ج) $س + ٤ \leq ١٠$	د) $س + ٤ \geq ١٠$
-----------------	-----------------	--------------------	--------------------



٣- أي المتباينات الآتية لها التمثيل البياني المجاور :

أ) $٣ \leq ٦ - ف$	ب) $٣ \leq ٦ + ف$	ج) $٣ \geq ٦ - ف$	د) $٣ < ٦ - ف$
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

٢- اكمل الفراغ التالي :

١- الطريقة المختصرة لكتابة مجموعة الحل تسمى **الصفة المميزة للمجموعة**

أراد أحد اللاعبين إحراز ١٥٠ نقطة على الأقل في هذا الموسم . وسجل حتى الآن ١٢٣ نقطة ، فكم نقطة بقيت عليه ؟

نفرض ان $ن =$ عدد النقاط اللازمة

$$١٥٠ \leq ١٢٣ + ن$$

$$١٢٣ - ١٥٠ \leq ١٢٣ - ١٢٣ + ن$$

$$٢٧ \leq ن$$

مجموعة الحل هي :

$$\{ ن | ن \geq ٢٧ \}$$

يجب أن يسجل ٢٧ نقطة على الأقل

حل كل من المتباينتين الآتيتين ثم مثل مجموعة حلها بيانيا على خط الأعداد .

$$٣ص + ٧ < ٨$$

$$٣ص + ٧ - ٧ < ٨ - ٧$$

$$٣ص < ١٥$$

$$\frac{٣ص}{٣} < \frac{١٥}{٣}$$

$$ص < ٥$$

مجموعة الحل هي :

$$\{ ص | ص < ٥ \}$$



$$٣ص + ٦ \geq ٢$$

$$٣ص + ٦ - ٦ \geq ٢ - ٦$$

$$٣ص \geq -٤$$


$$\frac{٣ص}{٣} \geq \frac{-٤}{٣}$$

$$ص \geq -\frac{٤}{٣}$$

$$ص \geq -١\frac{١}{٣}$$

مجموعة الحل هي :

$$\{ ص | ص \geq -١\frac{١}{٣} \}$$



٤-٢ حل المتباينات بالضرب أو القسمة

اختبر نفسك



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- حل المتباينة $٤س < ٣٢$ هي :

أ) $س < ٨$	ب) $س > ٨$	ج) $س > ٢٨$	د) $س < ٢٨$
------------	------------	-------------	-------------

٢- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١- إذا قسم كل من طرفي المتباينة على عدد سالب يتغير إشارة المتباينة الناتجة لتكون صحيحة (✓)

جمعت دار نشر أكثر من ٦٠٠٠ ريال من بيع كتاب جديد ، ثمن النسخة الواحدة ١٥ ريالاً . عرف متغيراً و اكتب متباينة تمثل عدد الكتب المباعة ثم حلها .

نفرض ان $ن =$ عدد الكتب المباعة

$$١٥ < ن < ٦٠٠٠$$

$$\frac{٦٠٠٠}{١٥} < ن < \frac{١٥}{١٥}$$

$$٤٠٠ < ن$$

حل كل من المتباينتين الآتيتين :

$$٣٣ < -٣س$$

$$\frac{٣٣}{-٣} > \frac{-٣س}{-٣}$$

(نغير إشارة المتباينة)

$$-١١ > س$$

مجموعة الحل هي :

$$\{ س | س < -١١ \}$$

$$\frac{١}{٤} م \geq ١٧$$

$$(٤) \frac{١}{٤} م \geq ١٧ (٤)$$

$$٦٨ \geq م$$

مجموعة الحل هي :

$$\{ م | م \geq ٦٨ \}$$

اكتشف الخطأ : حل كل من طلال و جمال المتباينة $٦ \leq ٨٤$. فأيهما كانت إجابته صحيحة ؟ اشرح تبريرك

الإجابة الصحيحة طلال

لأنه لا يحتاج لعكس إشارة المتباينة عند القسمة على عدد موجب

جمال

$$٨٤ \leq ٦$$

$$\frac{٨٤}{٦} \geq \frac{٦}{٦}$$

$$١٤ \geq ١$$

طلال

$$٨٤ \leq ٦$$

$$\frac{٨٤}{٦} \leq \frac{٦}{٦}$$

$$١٤ \leq ١$$



اختبر نفسك

٤-٣ حل المتباينات المتعددة الخطوات



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- حل المتباينة $3س + 7 < 43$ هو :			
أ) $س < 12$	ب) $س > 12$	ج) $س > 36$	د) $س < 36$
٢- وفرت عزيزة ٥٢ ريالاً لشراء كتاب يزيد ثمنه على ٩٠ ريالاً ، ما المبلغ الإضافي الذي يجب ان توفره عزيزة لشراء الكتاب ؟			
أ) ٣٨ ريالاً	ب) أكثر من ٣٨ ريالاً	ج) ليس أكثر من ٣٨ ريالاً	د) ٣٨ ريالاً على الأكثر

٢- اكمل الفراغ التالي :

١- يمكن التعبير عن مثلاً عدد ما يقل عن خمس ذلك العدد ناقص ٣ بالعلاقة الجبرية $س٢ > \frac{1}{5} س٢ - ٣$

٣- حل كل من المتباينتين الآتيتين :

$$\begin{aligned}
 ١٣ س - ١١ &\geq ٧ س + ٣٧ \\
 ١٣ س - ١١ + ١١ &\geq ٧ س + ٣٧ + ١١ \\
 ١٣ س &\geq ٧ س + ٤٨ \\
 ١٣ س - ٧ س &\geq ٤٨ \\
 ٦ س &\geq ٤٨ \\
 \frac{٦ س}{٦} &\geq \frac{٤٨}{٦} \\
 س &\geq ٨ \\
 \text{مجموعة الحل هي :} \\
 \{ س | س \geq ٨ \}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ٥ - (٤ + ق) &< ٣ (٤ - ق) \\
 ٥ - ق - ٢٠ &< ٣ ق - ١٢ \quad (\text{خاصية التوزيع}) \\
 ٥ - ق - ٢٠ + ٢٠ &< ٣ ق - ١٢ + ٢٠ \\
 ٥ - ق &< ٣ ق + ٨ \\
 ٥ - ق - ٣ ق &< ٨ \\
 ٥ - ٤ ق &< ٨ \\
 -٤ ق &< ٣ \\
 \frac{-٤ ق}{-٤} &> \frac{٣}{-٤} \\
 ق &> -\frac{٣}{٤} \\
 \text{مجموعة الحل هي :} \\
 \{ ق | ق > -\frac{٣}{٤} \}
 \end{aligned}$$

٤- حدد المتباينة التي تختلف عن المتباينات الثلاث الأخرى . وفسر إجابتك .

$٥ - ٢ > ١٣$	$٥ - ٢ > ١$	$٥ < ٤ - ٣$	$٣ - ٩ < ٤$
--------------	-------------	-------------	-------------

٤ ص $٣ - ٩ < ٤$ إذ أنها المتباينة الوحيدة من بين المتباينات الأربع التي مجموعة حلها ليست

$\{ ص | ص < ٣ \}$



١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- أي المتباينات المركبة الآتية حلها مبين في التمثيل البياني المجاور ؟			
(أ) $1 < n < 3$	(ب) $1 \leq n \leq 3$	(ج) $1 < n$ أو $3 > n$	(د) $1 > n \geq 3$

٢- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة :

١- في المتباينات المركبة حرف (أو) يعني التقاطع و حرف (و) يعني الاتحاد (✗)


٣- حل كل من المتباينتين الآتيتين و مثل مجموعة الحل بيانيا :

$$\text{ص} - 1 \leq 7 \text{ أو } \text{ص} + 3 > 1$$

$$\text{ص} - 1 \leq 7 \quad \text{أو} \quad \text{ص} + 3 > 1$$

$$\text{ص} - 1 + 1 \leq 7 + 1 \quad \text{ص} + 3 - 3 > 1 - 3$$

$$\text{ص} \leq 8 \quad \text{ص} > -4$$



$$6 \leq 7 + r < 10$$

اكتب هذه المتباينة في صورة متباينتين باستعمال (و) ثم نحل كلا المتباينتين

$$6 \leq 7 + r < 10 \quad \text{و} \quad 7 + r < 10$$

$$6 - 7 \leq 7 + r - 7 < 10 - 7$$

$$-1 \leq r < 3$$

مجموعة الحل هي : $\{r | -1 \leq r < 3\}$



٤- اكشف الخطأ : حل كل من سعد و مسفر المتباينة $2 > 3$ س - $7 > 5$. فإيهما إجابته صحيحة ؟ اشرح

الإجابة الصحيحة / كلاهما خطأ

لم يضيف سعد ٥ إلى ٧ ، ولم يضيف مسفر ٥ إلى ٣

مسفر

$$2 > 3 \text{ س} - 7 > 5$$

$$2 < 3 \text{ س} - 12 > 7$$

$$\frac{2}{2} < \frac{3}{2} \text{ س} - 6 > \frac{7}{2}$$

سعد

$$2 > 3 \text{ س} - 7 > 5$$

$$2 > 8 \text{ س} - 7 > 5$$

$$4 > \frac{7}{2} \text{ س} - \frac{7}{2} > \frac{5}{2}$$

تبريرك




١- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١- المتباينة التي تمثل الموقف الربح ٢٥٥ ريالاً بزيادة أو نقصان لا يتجاوز ٥ ريالات هي :

- (أ) $|س - ٥| > ٢٥٥$ (ب) $|س| \geq ٢٦٠$ (ج) $|س - ٢٥٥| \geq ٥$ (د) $|س - ٢٥٥| > ٥$

٢- أي المتباينات الآتية حلها مبين في الشكل البياني المجاور ؟



- (أ) $|س - ٢| > ٣$ (ب) $|س - ٢| < ٣$ (ج) $|س - ٢| \leq ٣$ (د) $|س - ٢| \geq ٣$

٢- اكمل الفراغ التالي :


١- مجموعة حل المتباينة $|ص - ١| > -٤$ هي $\emptyset$ (مستحيلة الحل)

٣- حل كل من المتباينتين الآتيتين ثم مثل مجموعة حلها بيانياً على خط الأعداد .

$$٣ \leq |٥ + ن|$$

$$\begin{aligned} ٣ \leq ٥ + ن \quad \text{أو} \quad ٣ \leq (٥ + ن) - \\ ٣ - \geq ٥ + ن \quad ٥ - ٣ \leq ٥ - ٥ + ن \\ ٥ - ٣ - \geq ٥ - ٥ + ن \quad ٢ - \leq ن \\ ٨ - \geq ن \end{aligned}$$


مجموعة الحل هي : $\{ن | ن \leq ٢ \text{ أو } ن \geq ٨\}$



$$٢ \geq |١ + ر|$$

$$\begin{aligned} ٢ \geq ١ + ر \quad \text{و} \quad ٢ \geq (١ + ر) - \\ ٢ - \leq ١ + ر \quad ١ - ٢ \geq ١ - ١ + ر \\ ١ - ٢ - \leq ١ - ١ + ر \quad ١ \geq ر \\ ٣ - \leq ر \end{aligned}$$

مجموعة الحل هي : $\{ر | ٣ - \geq ر \geq ١\}$



اكتشف الخطأ : مثل أحمد حل المتباينة $|٢ - ٣| < ١$. كما في الشكل . فهل كان على صواب ؟ فسر إجابتك .



لا ، لأن أحمد نسي تغيير اتجاه إشارة المتباينة في الحالة السالبة للقيمة المطلقة .